

Assessment of Dual antiplatelet therapy versus Rivaroxaban In atrial Fibrillation patients Treated with left atrial appendage closure:



« Chers Collègues Nous sommes heureux de partager avec vous ce premier numéro de la Newsletter de l'Etude ADRIFT. On compte sur vous! » – G. Montalescot

Les Chiffres	Patients Randomisés	Date d'ouverture
01 - Pitié Salpêtrière - Pr Montalescot	5	11/09/2017
11 - HEGP- Pr Spaulding	2	5/10/2017
10 - CCN - Dr Attias	-	3/10/2017
13 - CHU Brabois - Dr Popovic	-	4/10/2017

En Bref.

Nombre de centres ouverts : 4/14

Nombre de patients randomisés : 7/90

Félicitations à l'équipe du Pr Spaulding!

Pour les centres déjà ouverts ou sur le point de l'être, vous allez bientôt recevoir des clés USB et DVD pour l'enregistrement des ETO ainsi que des boîtes d'envoi en congelé (TNT).

Nous contacter.

Catherine PONS, ARC au 01 40 05 43 67 (catherine.pons@aphp.fr) & Marie Eve ASSOSSOU, Coordinatrice au 01 40 05 49 75 (marie-eve.assossou@aphp.fr) Contact Corelab: Delphine BRUGIER au 01 42 16 29 18 (delphine.brugier-ext@aphp.fr)

Question du Jour:

J'ai prévu d'inclure un patient. La fermeture d'auricule gauche a eu lieu mais je ne veux le randomiser que dans 1 ou 2 jours. Quel traitement thrombotique lui donner?

Réponse du Jour:

Nous préconisons de le mettre sous HBPM en attendant, afin d'éviter des trithérapies anti thrombotiques et les effets rémanents des antiplaquettaires.

Info pratique.

On peut considérer que si le neurologue vous adresse un patient pour une fermeture d'auricule gauche (moins de 6 mois après son hémorragie intracrânienne) c'est qu'il considère que l'on peut reprendre un traitement anti-thrombotique sur 3 mois (à discuter avec lui).



**LA RECHERCHE CLINIQUE A BESOIN DE VOUS!
NE MANQUEZ PAS NOS PROCHAINES NEWSLETTERS
#larecherchenattendpas#oncomptesurvous#**

"Dire que nous foulons ce sol de la Lune où jamais la main de l'homme n'a mis le pied!"

De Hergé / Dupond dans On a marché sur la Lune