

Assessment of Dual antiplatelet therapy versus Rivaroxaban In atrial Fibrillation patients Treated with left atrial appendage closure:



| Hôpital | Activation | Patients inclus |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| Pitié Salpêtrière - Pr Montalescot | 11/09/2017 | 13 |
| BICHAT - Dr Juliard | 06/11/2017 | 8 |
| HEGP - Pr Spaulding | 05/10/2017 | 4 |
| CHRU Lille - Pr Klug | 15/01/2018 | 1 |
| CHRU Brest - Dr Mansourati | 27/11/2017 | 1 |
| CCN - Dr Attias | 03/10/2017 | 1 |
| CHRU Nancy - Dr Popovic | 04/10/2017 | 1 |

Nombre de centres ouverts : 13/14

Nombre de patients randomisés : 29/90

Félicitations aux centres de Nancy, de Brest et du CCN pour leur premier patient!

Nous sommes sur une excellente dynamique,
merci à tous pour votre implication et votre participation
à notre journée Action du 19/01!

Pour nous contacter:

Catherine PONS, 01 40 05 43 67 (catherine.pons@aphp.fr)
Marie Eve ASSOSSOU, 01 40 05 49 75 (marie-eve.assossou@aphp.fr)
Nathalie DEPYE, 01 42 16 30 97 (nathalie.depye-ext@aphp.fr)

Peut-on inclure les patients qui....

...ont une angiopathie amyloïde?

*Ce n'est pas un critère d'exclusion, ceci est
laissé au jugement de l'investigateur.*

*Plusieurs de ces patients ont déjà été
inclus.*

...ont eu un saignement neurologique sans
l'avis d'un neurologue?

*Avis nécessaire **seulement si**:*

- ♦AVC ischémique <6 semaines
- ♦AVC hémorragique < 6 mois


... sont sous Xarelto initialement?

*Oui, en revanche ils doivent avoir
conscience qu'ils vont peut-être passer sous
DAPT. Pour rappel, la DAPT reste le
traitement de référence en post FAG.*

... ont eu des antécédents de saignement
digestif sans l'avis du gastro-entérologue?

*Oui, l'avis du gastro-antérologue n'est pas
obligatoirement requis.*

Petit rébus pour les plus curieux d'entre vous, à vos méninges !!



Réponse dans la prochaine newsletter!